Alerte: XTC avec doses extrêmement élevées

Juin 2019

Nom	**Transformers**
Poids	510 mg
Long. x Larg.	10 x 10 mm
Epaisseur	4 mm
Rainure de cassure	non
Couleur	gris
Contenu	**MDMA 240 mg**
Testé à	Genève, Juin 2019

Evaluation des risques

Plus de 120 mg MDMA peuvent être trop ! En cas de surdosage, différents effets secondaires se manifestent : contractions de la mâchoire, tremblements musculaires, nausées/vomissements et augmentation de la tension artérielle. Toujours en cas de surdosage, la température du corps augmente plus fortement et il peut y avoir des hallucinations. Durant les jours qui suivent la consommation de fortes doses de MDMA, peuvent survenir sentiments de dépression, manque de concentration, le sommeil et l'appétit. Une consommation régulière d'importantes doses de MDMA est neurotoxique et augmente le risque de dégâts irréparables au cerveau.

MDMA - infos

Informations générales: La MDMA (3,4-méthylène dioxyméthamphétamine) est un dérivé synthétique des amphétamines. Présentation: le plus souvent sous forme de pilules, rarement sous forme de poudre ou de capsules. Formes de consommation: la MDMA est le plus souvent avalée, plus rarement sniffée.

Dosage: Au maximum 1,5 mg de MDMA par kilo de poids pour les hommes, au maximum 1,3 mg par kilo de poids pour les femmes.

Effet: Début de l'effet: après env. 30 min. Attention, certaines personnes ne ressentent l'effet qu'après 90 minutes! Durée de l'effet: 4 à 6 heures. La MDMA entraîne une production accrue d'un neurotransmetteur, la sérotonine. Les sensations de faim et de soif sont réduites, la fatigue éliminée, l'attention s'accroît ainsi que la température corporelle et la pression sanguine. Sous MDMA, on se sent léger et libre de tout souci. Un sentiment de bien-être t'envahit. Les facultés visuelles et auditives se modifient. Caresses et musique gagnent en intensité, les inhibitions tombent et le besoin de contact s'accroît.

Effet secondaire: Contraction de la mâchoire, tremblements des muscles, nausées/vomissements et augmentation de la tension artérielle. L'ecstasy est particulièrement éprouvante pour le coeur, le foie et les reins. Il y a également danger de coup de chaleur, puisque la température du corps augmente.

Risques à long terme: Une consommation à haute dose et prolongée d'ecstasy peut conduire à des modifications du système sérotoninergique. La probabilité de dommages permanents du cerveau augmente en cas de fortes doses répétées et de pauses trop courtes entre les prises.

Règles du safer use

- Si tu n’as pas la possibilité de faire analyser ta substance, teste d’abord au maximum un tiers du

Alerte: XTC avec doses extrêmement élevées

Juin 2019

comprimé. Beaucoup de pilules en circulation sont aujourd'hui hautement dosées.

- Après la prise, attends 2 heures, car des pilules contenant des principes actifs inattendus et dont le début des effets peut être retardé sont toujours en circulation.
- Pense à boire assez de boissons non-alcoolisées
  (3 dl / heure), à faire de temps en temps une pause à l'air frais. Et, n'oublie pas que chaque soirée a sa fin!
- Accepte lorsque l'effet est terminé, si tu en reprends, la toxicité de la MDMA augmente.